

**Критерии максимального риска наличия тяжелых повреждений**

По видам повреждений	По витальным функциям
Проникающее/тяжелое ранение головы, шеи, туловища, проксимальных отделов конечностей	<p><u>Все пострадавшие:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не могут выполнять команды (движения по ШКГ &lt;6);</li> <li>- частота дыхательных движений (ЧДД)&lt;10 или ЧДД &gt;29/мин;</li> <li>- нуждаемость в поддержке функции дыхания;</li> <li>- насыщение периферической крови кислородом &lt;90%.</li> </ul>
Деформация костей свода черепа, подозрение на перелом основания черепа	
Подозрение на спинальную травму с чувствительными и/или двигательными нарушениями	
Деформация и нестабильность реберного каркаса, реберный клапан	
Подозрение на перелом костей таза	<p><u>Дети 0-9 лет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систолическое АД &lt;70 мм рт.ст. + (2 x возраст)</li> </ul>
Подозрение на перелом $\geq 2$ длинных проксимальных трубчатых костей (бедренная/плечевая)	<p><u>Дети и взрослые 10-64 лет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систолическое АД &lt;90 мм рт.ст.</li> <li>- пульс &gt; систолического АД</li> </ul>
Размозжение/разрушение конечности, отсутствие пульса на конечности	
Отрыв конечности выше лодыжек или лучезапястного сустава	
Продолжающееся наружное кровотечение, требующее наложения жгута или тампонады раны с непрерывным давлением на нее	<p><u>Взрослые &gt;65 лет:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- систолическое АД &lt;110 мм рт.ст.</li> <li>- пульс &gt; систолического АД</li> </ul>