

Шкала MODS
(Multiple Organs Disfunction Score)

| Система | Параметр | Баллы | | | | |
|---------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дыхательная | PO ₂ /FIO ₂ | > 300 | 226-300 | 151-225 | 76-150 | ≤ 75 |
| Мочевыделительная | Креатинин сыворотки, мкмоль/л (мг%) | ≤ 100 (≤ 1,1) | 101-200 (1,1-2,3) | 201-350 (2,3-4,0) | 351-500 (4,0-5,7) | > 500 (> 5,7) |
| Печень | Билирубин сыворотки, мкмоль/л (мг%) | ≤ 20 (≤ 1,2) | 21-60 (1,2-3,5) | 61-120 (3,5-7,0) | 121-240 (7,0-14,0) | > 240 (> 14,0) |
| Сердечно-сосудистая | PAR (коэффициент соотношения ЧСС и АД)* | ≤ 10,0 | 10,1-15,0 | 15,1-20,0 | 20,1-30,0 | > 30,0 |
| Гематологическая | Тромбоциты, в мкл | > 120000 | 81000-120000 | 51000-80000 | 21000-50000 | ≤ 20000 |
| ЦНС | Оценка по шкале Глазго, баллы | 15 | 13-14 | 10-12 | 7-9 | ≤ 6 |

Примечание: * PAR – Pressure Adjusted Heart Rate = (ЧСС в мин.) × (давление в правом предсердии в мм рт.ст.) / (среднее АД в мм рт.ст.), среднее АД = (АД_{сисст.} + 2×АД_{диаст.})/3.

| Балл | Смертность в ОРИТ | Госпитальная смертность | Продолжительность нахождения в ОРИТ |
|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 0 | 0% | 0% | 2 дня |
| 1-4 | 1-2% | 7% | 3 дня |
| 5-8 | 3-5% | 16% | 6 дней |
| 9-12 | 25% | 50% | 10 дней |
| 13-16 | 50% | 70% | 17 дней |
| 17-20 | 75% | 82% | 21 день |
| 21-24 | 100% | 100% | |